



Meststoffen reglement tuinvereniging Kringloop

1. Wie een tuin in huur heeft van de vereniging, dient die bemestingsmaatregelen te nemen die tot bevordering en instandhouding van de vruchtbaarheid en de biologische activiteit geëigend zijn.

De tuingebruiker dient door het juiste gebruik van oude runder- en paardenmest, RHP-gecertificeerde meststoffen, compost en ander organisch materiaal, zoals bij voorbeeld de verbouw van groenbemestings-gewassen, grond en gewas in een gezonde toestand te brengen en te houden.

Bij grond verbetermiddelen die door de vereniging worden ingekocht voor algemeen gebruik door alle leden, wordt de af te nemen hoeveelheid en de eventuele kosten per tuin bepaald door het bestuur. Deze bepalingen worden kenbaar gemaakt aan de leden middels de nieuwsbrief en zijn terug te lezen op de website van de tuinvereniging.

2. Het gebruik van organische hulpmeststoffen is als aanvullende bemesting geoorloofd, mits de daardoor toegevoegde hoeveelheid stikstof geen evenwichtsverstoring in de bodem veroorzaakt en de toediening zoveel mogelijk via het composteringssysteem verloopt. Tot de organische hulpmeststoffen waarvan het gebruik onder de vermelde voorwaarden geoorloofd is, behoren ook die welke afkomstig zijn van kleinvee zoals kippen, konijnen, duiven, en dergelijke.

3. De volgens punt 2 hierboven bedoelde organische hulpmeststoffen mogen geen gifhoudende schadelijke stoffen bevatten, of andere stoffen die het bodemleven en/of de kwaliteit van het gewas (houdbaarheid, smaak, geur, verteerbaarheid, en dergelijke) nadelig kunnen beïnvloeden.

4. De door de vereniging toegestane meststoffen zijn:

- | | |
|----------------------|---|
| • Patentkali | Versterkt vruchten en knolgewassen. |
| • Maerl | Bindt zuren en verbetert houdbaarheid. |
| • Beendermeel | Geeft extra stikstof. |
| • Bloedmeel | Geeft extra stikstof voor bladgroenten, erwten, bonen, uien |
| • Kippenmestkorrels | Bevatten stikstof, fosfaat en micro-elementen voor tomaten, kool, wortelen, uien, prei, bonen, bladgroenten. Oplossen in water. |
| • Lavameel | Natuurlijk afweermecanisme tegen ziekten en parasieten. |
| • Thomas slakkenmeel | Werkst zuurverlagend en pH-verhogend. Bevordert vruchtvorming. Direct na het spitten strooien. |
| • Dolomietkalk | Ontzuurt compost. |
| • Basaltmeel | Werkst opdrogend, verhoogt zuurgraad, bevat kiezel, verstevigt de weerstand van de plant. |

5. De door de vereniging toegestane biologische gewas- beschermingsmiddelen zijn onder andere:

- Pyrethrum vloeibaar alle zuigende en vretende insecten

- Spruzit alle zuigende en vretende insecten
- Plantschoon alle zuigende en vretende insecten
- Thuricide rupsen, koolmot en andere larven
- Bactospeïne rupsen, koolmot en andere larven
- Brandnetelpreparaat insectenvraat
- Lac balsem afdekmiddel bij boomwonden
- Preicobakt bevordert gezondheid boomstammen
- Bio boomuitstrijk bevordert gezondheid boomstammen

Voor het tegengaan van slakkenvraat is, naast bekende huismiddeltjes als koffiedrab, biervallen, houtsnippers en ander ruw materiaal, uitsluitend het in de handel verkrijgbare middel Escar-Go® toegestaan.

Ook kunnen biologische gewas-beschermingsmiddelen zelf worden vervaardigd, zoals gier op basis van water met brandnetel, alsem, boerenwormkruid of paardenstaart (heermoes).

Deze planten komen op diverse plaatsen op de Kringlooptuin voor. Ook een oplossing van zachte zeep kan gebruikt worden voor het bestrijden van insecten.

6. Niet toegestaan is het gebruik van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen, herbiciden, verdelgingsmiddelen voor schadelijke insecten en dieren, grondontsmettingsmiddelen, gier, drijfmest, hormoon bevattende preparaten en soortgelijke middelen ter bevordering van de groei, vruchtbaarheid, rijping, kleur en dergelijke. Ook kiemremmings- en ontsmettingsmiddelen tijdens het bewaren mogen op de tuin niet worden gebruikt.

7. Om bij de teelt van aardappelen het optreden van de schimmelziekte phytophthora tegen te gaan, mogen alleen vroege aardappelrassen worden verbouwd. Het loof mag niet gecomposteerd worden, maar moet direct worden afgevoerd om schimmelziekte te voorkomen. Aardappelen mogen pas na drie jaar weer op hetzelfde perceel worden geteeld.

Indien aardappelziekte op het complex is geconstateerd zal het bestuur de leden schriftelijk sommeren de bovengrondse plantendelen onmiddellijk te verwijderen.

Wanneer een tuinlid hierin nalatig is, behoudt het bestuur zich het recht voor om in te grijpen.